

CHAPITRE 8 : INTERACTIONS LUMIÈRE-MATIÈRE

Pierre-André LABOLLE

Lycée International des Pontonniers

Décembre 2014

I. Modèle corpusculaire de la lumière

1. Insuffisance du modèle ondulatoire

➡ Activité 3 de la page 56

- La lumière est une onde électromagnétique caractérisée par sa fréquence ν ou sa longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$.
- Ce modèle permet de bien expliquer un certain nombre de phénomènes tels la dispersion, la diffraction, les interférences, optique géométrique, etc
- En revanche, il ne permet pas de rendre compte d'autres phénomènes comme le rayonnement thermique du corps noir, l'interaction entre lumière et matière (effet photoélectrique par exemple), les spectres de raies des atomes, etc

I. Modèle corpusculaire de la lumière

2. Le photon : particule de lumière

- En 1900, Max Planck établit la théorie des quanta selon laquelle les échanges d'énergie entre lumière et matière se font par paquets d'énergie appelés quanta
- Un quantum d'énergie contient une énergie (en joule J) proportionnelle à la fréquence de l'onde (en hertz Hz) de sorte que : $E = h \cdot \nu$ où $h = 6,626076 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ est appelée constante de Planck.
- Puisque $\nu = \frac{c}{\lambda_0}$, cette relation peut aussi s'écrire : $E = \frac{h \cdot c}{\lambda_0}$

I. Modèle corpusculaire de la lumière

2. Le photon : particule de lumière

- En 1905, Albert Einstein établit que cette énergie est portée par une particule appelée **photon** (ou grain de lumière).

Conclusion

À une onde électromagnétique de fréquence ν est associée une particule appelée photon véhiculant une énergie $E = h \cdot \nu$. La lumière a donc un double aspect ondulatoire et corpusculaire. On parle de **dualité onde-corpuscule**.