

CHAPITRE 8 : INTERACTIONS LUMIÈRE-MATIÈRE

Pierre-André LABOLLE

Lycée International des Pontonniers

Décembre 2014

I. Modèle corpusculaire de la lumière

1. Insuffisance du modèle ondulatoire

➡ Activité 3 de la page 56

- La lumière est une onde électromagnétique caractérisée par sa fréquence ν ou sa longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$.
- Ce modèle permet de bien expliquer un certain nombre de phénomènes tels la dispersion, la diffraction, les interférences, optique géométrique, etc
- En revanche, il ne permet pas de rendre compte d'autres phénomènes comme le rayonnement thermique du corps noir, l'interaction entre lumière et matière (effet photoélectrique par exemple), les spectres de raies des atomes, etc

I. Modèle corpusculaire de la lumière

2. Le photon : particule de lumière

- En 1900, Max Planck établit la théorie des quanta selon laquelle les échanges d'énergie entre lumière et matière se font par paquets d'énergie appelés **quanta**
- Un quantum d'énergie contient une énergie (en joule J) proportionnelle à la fréquence de l'onde (en hertz Hz) de sorte que : $E = h \cdot \nu$ où $h = 6,626076 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ est appelée constante de Planck.
- Puisque $\nu = \frac{c}{\lambda_0}$, cette relation peut aussi s'écrire : $E = \frac{h \cdot c}{\lambda_0}$

I. Modèle corpusculaire de la lumière

2. Le photon : particule de lumière

- En 1905, Albert Einstein établit que cette énergie est portée par une particule appelée **photon** (ou grain de lumière).

Conclusion

À une onde électromagnétique de fréquence ν est associée une particule appelée photon véhiculant une énergie $E = h \cdot \nu$. La lumière a donc un double aspect ondulatoire et corpusculaire. On parle de **dualité onde-corpuscule**.

II. Quantification des niveaux d'énergie dans les atomes

1. Niveaux d'énergie des atomes

- Comme tout système physique, un atome possède une énergie qui résulte notamment des interactions électrons/noyau stabilisantes (car attractives) et des interactions électron/électrons répulsives.
- Contrairement aux systèmes physiques à notre échelle, l'énergie d'un atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur mais seulement certaines valeurs discrètes (c'est-à-dire formant une suite discontinue). Ces valeurs d'énergie sont appelées niveaux d'énergie.
- On dit ainsi que l'énergie des atomes est quantifiée.
 - ➡ Activité 4A de la page 57

II. Quantification des niveaux d'énergie dans les atomes

1. Niveaux d'énergie des atomes

Définition : état fondamental

Le niveau de plus basse énergie correspond à l'atome dans son état stable. On parle d'état fondamental.

Définition : états excités

Les niveaux d'énergie supérieure à celle de l'état fondamental sont appelés états excités.

Définition : l'électronvolt

L'électronvolt est une unité d'énergie adaptée à l'échelle des atomes. $1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

II. Quantification des niveaux d'énergie dans les atomes

2. Transitions atomiques

- Lorsqu'un atome reçoit de l'énergie (collision avec un électron projectile ou absorption d'un photon par exemple), il peut passer de son état fondamental à un état excité ; on parle alors d'absorption.
- Lorsqu'un atome est dans un état excité (donc instable), il peut se désexciter en rendant une partie de son énergie : il passe d'un état excité à un état plus stable, d'énergie plus faible ; on parle alors d'émission.
- Ces deux phénomènes d'absorption et d'émission sont appelés des transitions atomiques.

Conclusion

Les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés. L'atome peut absorber ou émettre de l'énergie au cours de transitions atomiques.